

"Согласовано"  
с профсоюзным комитетом

"Утверждаю"  
Руководитель Филиала: \_\_\_\_\_

Председатель профкома: \_\_\_\_\_ Г.П. Храмова  
Протокол № 1 от "31" августа 2020 г.

Н.Ю.Сергунина  
Приказ № 50 от 26 августа 2020 г.

## Инструкция по проведению дезинфекции помещений Филиала «ОШ с.Зелёновка» при коронавирусе

### 1. Общие положения.

- 1.1. Настоящая инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе разработана на основании Письма Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами». Действие инструкции распространяется на всех сотрудников, принимающих участие в проведении дезинфекции и обработке помещений.
- 1.2. Данная инструкция по дезинфекции помещений содержит основные требования, предъявляемые к дезинфекции помещений в организации и личной гигиене работников, особенностям проведения профилактических мероприятий, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19.
- 1.3. В связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекцией работники школы допускаются к работе после прохождения внепланового инструктажа по изучению профилактических мер по предупреждению распространению инфекции, детального изучения данной инструкции, а также с соблюдением всех мер предосторожности.
- 1.4. Обслуживающий персонал должен соблюдать инструкцию по дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции, иметь допуск к работе.
- 1.5. Профилактическая дезинфекция начинается незамедлительно при возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в коллектив Филиала, где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.
- 1.6. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора, для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп:
  - Хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – с концентрацией активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин В - с концентрацией активного хлора в рабочем растворе не менее 3%);
  - Кислородактивные (перекись водорода с концентрацией не менее 3%);
  - Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) – четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);
  - Третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);
  - Полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);
  - Спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе)

Порядок использования отдельных дезинфекционных средств рекомендуемых органами Роспотребнадзора, и режимы дезинфекции приводятся в инструкциях по применению данных средств.

1.7. Работники с целью соблюдения требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции должны:

- Строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса COVID-19 на территории организации;
- Соблюдать рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для работников;
- Оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе возможно лишь при наличии справки из медучреждения о выздоровлении;
- Содержать в порядке и чистоте своё рабочее место и инвентарь;
- Содействовать и сотрудничать с руководителем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему руководителю или лицу его замещающему о любом ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков новой коронавирусной инфекции;
- Выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;
- Пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски носить согласно правилам ношения маски при коронавирусе, одноразовые перчатки, а также кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и характеру выполняемой работы;
- При отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить об этом в известность руководителя;
- Незамедлительно уведомлять руководителя о любой ситуации, несущей угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, о любом произошедшем несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья;
- Придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой коронавирусной инфекции;
- Знать пути передачи, признаки заболевания и меры профилактики коронавирусной инфекции, инструкцию по профилактике коронавируса в организации, методы предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
  - Работники должны знать, что механизмами передачи коронавирусной инфекции являются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный пути.
  - Работники обеспечены, согласно установленным нормам дезинфицирующими средствами, санитарной одеждой.
  - Обслуживающему персоналу занимающемуся дезинфекцией помещений.  
Необходимо:
    - Санитарную одежду и обувь хранить в специально установленных для этого местах;
    - Верхнюю одежду и обувь, головные уборы, личные вещи оставлять в гардеробе;
    - Выполнять работу исключительно в санитарной одежде и менять её по мере загрязнения;
    - Неукоснительно соблюдать меры личной гигиены;
    - Производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа;
    - Обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;
    - Имеет запас дезинфицирующих средств, необходимый уборочный инвентарь, а также их запас в необходимом количестве.
- С целью предупреждения и нераспространения коронавирусной инфекции, желудочно-кишечных, паразитарных и иных инфекционных заболеваний работникам необходимо знать и неукоснительно соблюдать нормы и правила личной гигиены:
- Коротко подстригать ногти и не наносить на них лак;

- Тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием) перед тем как начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыва в работе, прикосновения к загрязнённым предметам, а также после посещения санузла, перед приёмом пищи и по окончании работы.

1.12. Обслуживающий персонал несёт ответственность за соблюдение требований данной инструкции при проведении дезинфекции помещений при коронавирусе согласно законодательству РФ.

## 2. Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения профилактической дезинфекции.

2.1. В организации приняты локальные акты по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение которых обязательно для всех работников.

2.2. организована системная работа по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID – 19, о мерах личной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомах ОРВИ.

2.3. Для работников на основании существующих документов и рекомендаций Роспотребнадзора разработаны и направлены правила личной и производственной гигиены, инструкция по профилактике коронавируса для работников, регламент уборки, инструкции по применению дезинфицирующих средств.

2.4. С целью профилактики и борьбы с коронавирусом COVID-19 проводят профилактическую и текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке в Российской Федерации ведётся журнал обработки помещений при коронавирусе. В инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

2.5. Ежедневно перед началом работы всем сотрудникам ответственным лицом измеряется температура тела с занесением результатов термометрии в журнал измерения температуры сотрудников.

2.6. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ работник отстраняется от работы и направляется домой для вызова медработника на дом.

2.7. перед началом работы обслуживающий персонал обеспечивается запасом одноразовых масок на день (исходя из продолжительности рабочей смены и режима смены масок не реже, чем 1 раз в 3 часа) одноразовых перчаток для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками либо кожными антисептиками для обработки рук дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажнённых масок не допускается.

2.8. Работники обязаны исполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.

2.9. Перед началом работы необходимо вымыть руки для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют проточной водой с мылом в течении 1-2 минут, в т.ч. после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами (антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта (влажные салфетки или гель)).

2.10. надеть спецодежду, одноразовые перчатки, одноразовую маску для лица.

2.11. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.

2.12. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор в рабочей ёмкости согласно притивовирусному режиму, указанному в инструкции на применяемое средство. В отдельной ёмкости приготовить раствор дезинфицирующего средства для периодической обработки рук в процессе дезинфекции.

2.13. На каждое убираемое помещение следует приготовить отдельный уборочный инвентарь (ведро, ветошь, ёмкости для приготовления рабочего раствора и др.)

214. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведённом сухом прохладном и затемнённом месте, недоступном для посторонних. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении дезсредством изложены для каждого конкретного дезсредства в инструкциях по их применению.

3. Санитарно-гигиенические требования во время проведения профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
  - 3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытьё рук с мылом и обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
  - 3.2. Уборку следует начинать с более чистых помещений (кабинеты) и заканчивая более загрязнёнными (лестничные марши, фойе, коридоры, санузлы).
  - 3.3. Следует, по возможности, проводить дезинфекцию одновременно с проветриванием.
  - 3.4. Ветошью, смоченной в приготовленном дезинфицирующем растворе, следует протереть поверхности столов, подоконников, клавиатуры, выключателей, предметов обстановки, мебели.
  - 3.5. После обработки поверхностей использованную ветошь сложить в отдельный мусорный мешок.
  - 3.6. Обработать руки в перчатках в течении 1-2 минут в приготовленном дезинфицирующем растворе.
  - 3.7. Приступить к обработке полов.
  - 3.8. Во время проведения профилактической дезинфекции санузлов следует подвергнуть тщательной обработке поверхности выключателей, водопроводных кранов, умывальников, унитазов.
  - 3.9. Дезинфекционная обработка всех контактных поверхностей (перила лестниц, выключатели, дверные ручки, поверхности столов, спинки стульев, оргтехники) проводится каждые 4 часа.
  - 3.10. В случае проведения дезинфекции способом орошения используют следующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): органы дыхания защищают респиратором, глаза – защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.
  - 3.11. Правила использования одноразовой медицинской маски:
    - надевать маску при выполнении работ по профилактической или текущей дезинфекции;
    - перед тем, как взять маску в руки, следует обработать их дезинфицирующим средством или вымыть с мылом;
    - надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась (при наличии завязок – их следует плотно завязать). Если одна из поверхностей имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу.
    - специальные складки на маске следует развернуть, вшитую гибкую пластину в области носа следует плотно прижать к спинке носа для обеспечения более плотного прилегания к лицу;
    - использовать маску однократно, повторное использование маски недопустимо;
    - менять маску необходимо каждые 3 часа или чаще. Если маска увлажнилась, следует незамедлительно заменить её на новую;
    - после использования маски выбросить её в пакет, плотно его завязать затем выбросить в пакет для отходов;
    - снять перчатки, вымыть руки с мылом (30-40 сек);
    - после мытья, руки обработать спиртосодержащим кожным антисептиком;
    - после обработки рук, при необходимости, надеть новую маску.
  - 3.12. Во время работ по проведению дезинфекции помещений следует соблюдать инструкции по охране труда при уборке помещений, инструкцию по проведению дезинфекции организации при коронавирусной инфекции, меры предосторожности приведённые в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя дезсредств.

4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании новой коронавирусной инфекцией.
  - 4.1. Работник, у которого имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, немедленно извещает своего непосредственного руководителя о своём состоянии.
  - 4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь в стационарных условиях.
  - 4.3. Использовать бактерицидные излучатели и другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения. В случае необходимости обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.
  - 4.4. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений от людей проводится дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надёжные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование, инвентарь производственных помещений, обеденных залов санузлов. Посуду больного, загрязнённую остатками пищи, дезинфицируют путём погружения в дезинфицирующий раствор и только потом тщательно промывается проточной водой в течение 10 минут. При обработке поверхностей применяется способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
  - 4.5 При подтверждении у работника заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
5. Санитарно-гигиенические требования по окончании проведения дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавируса.
  - 5.1. Уборочный инвентарь следует замочить в дезинфицирующем растворе методом погружения, затем высушить и убрать в отведённое место
  - 5.2. После проведения профилактической дезинфекции обслуживающий персонал должен:
    - обработать обувь салфеткой или ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, использованную салфетку или ветошь поместить в отдельный мусорный мешок;
    - обработать руки в перчатках дезрастворов в течении 1-2 минуты, приготовленном заранее в отдельной ёмкости и используемом только для обработки рук в перчатках;
    - снять спецодежду, свернув наружной стороной внутрь и поместить её в одноразовый мешок с последующим замачиванием её в растворе дезинфицирующего средства;
    - обработать руки в перчатках дезрастворов в течении 1-2 минуты, приготовленном заранее в отдельной ёмкости и используемом только для обработки рук в перчатках;
    - снять очки, оттягивая их от лица, двумя руками вперёд, вверх и назад за голову и двукратно протереть кожным спиртосодержащим антисептиком;
    - снять маску, не касаясь лица наружной её стороной и поместить её в мусорный мешок;
    - обработать руки в перчатках в течении 1-2 минуты, в ёмкости с рабочим дезраствором;
    - снять перчатки и поместить их в мусорный мешок;
    - тщательно, не менее 30 сек. помыть руки с мылом;
    - протереть руки и открытые части лица и тела спиртосодержащим кожным антисептиком;
    - по возможности принять душ.
6. Ответственность.
  - 6.1. Обслуживающий персонал несёт ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции по проведению дезинфекции организаций при новой коронавирусной инфекции.
  - 6.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы заболевания новой коронавирусной

инфекцией или его распространения, распространителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 236 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

6.3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заражения или создало условия для этого, может быть наказано лишением свободы до 2-х лет, ограничением свободы или принудительными работами, а также штрафом от 500 до 700 тыс.руб

6.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на руководителя организации.

Инструкцию разработал: \_\_\_\_\_

С инструкцией ознакомлены: